

China officinalis



Matière médicale résumée

Noms & synonymes



- ❧ Allemand : *Cinchona pubescens*, Fieberrindenbaum
- ❧ Anglais : Peruvian bark
- ❧ Français : Quinquina rouge
- ❧ Latin botanique : *Cinchona succirubra*; *China rubra*,
China calisaya
- ❧ Latin homéopathique : *China officinalis*
- ❧ Abréviation usuelle : China

Deux mots d'histoire



- ❧ Bien connue des populations locales, cette écorce permit de guérir la comtesse Chinchon, femme du vice-roi du Pérou (atteinte de fièvre tierce). Par la suite, elle fut commercialisée en Europe par les jésuites.
- ❧ À l'époque où Hahnemann avait cessé d'exercer et vivait de ses traductions, il traduisit la matière médicale de William Cullen, pharmacologue écossais. Il lut que cette écorce, capable de guérir le paludisme, était susceptible d'en provoquer les symptômes. (B. Vonarburg)
- ❧ Curieux, il l'essaya et ce fut la redécouverte de la loi de similitude, déjà citée par Hippocrate, 500 ans avant J.C.
- ❧ Ce fut la première pathogénésie.

La souche



- ❧ C'est l'écorce d'un arbre des forêts pluviales à l'est des Andes, aux feuilles opposées persistantes, vert sombre au dessus, rouge sang en dessous.
- ❧ Origines: Bolivie, Pérou, équateur & Colombie.
- ❧ Il pousse à une altitude de 1500 à 2500 m. sous humidité et température constantes.



Classification systématique



- ❧ Règne : Plantes
- ❧ Division: Magnolophytes
- ❧ Ordre: Rubiales
- ❧ Famille: **Rubiacées**
- ❧ Genre: Cinchona
- ❧ Espèce: Cinchona officinalis



Substances actives



- ❧ Des alcaloïdes quinoléiques : la quinine, son homologue déméthoxylé la cinchonidine et un stéréo-isomère de la quinine, la cinchonine
- ❧ Des composés phénoliques : des cinchonaines
- ❧ Des proanthocyanidols dimères et trimères.
- ❧ Des anthraquinones; des résines; des tannins
- ❧ Des acides organiques (acide quinique), des saponosides
- ❧ De l'huile essentielle (alpha-terpinéol, linalol, limonène).
- ❧ Un colorant rouge, des substances amères

Toxicologie



- ∞ Quinine pure est fort toxique (10-15 g. † d'un homme)
- ∞ Freine le métabolisme, la fonction glycogénique du foie
- ∞ Attaque les hématies, hémorragies dans les organes, les cavités: → anémie
- ∞ L'écorce l'est bien moins: acouphènes, troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée, hypersensibilité au bruit, à la lumière, maux de tête martelants, vertiges, fièvre intermittente et faiblesse cardiaque)

Usages non homéopathiques



∞ Internes

- ∞ Toniques & fortifiants (dans le vin, le « quinquina »)
- ∞ Renforce la sécrétion de salive et des sucs digestifs
- ∞ Aromatisant amer (liqueurs, bitter lemon)


∞ Externes

- ∞ Soins de la peau
- ∞ Gargarismes contre l'angine

Psychisme



- ❧ C'est un écorc(h)é vif ; coléreux⁴; tend à vexer les autres⁴(2); plein de soucis pour des riens³(8); méprise tout³(4);
- ❧ Apathique⁴ & irritable⁴; Peurs⁴, de nuit³, des animaux⁴ la nuit⁴(1)
- ❧ Hypersensible⁴ [bruit⁴, toucher¹(45)]
- ❧ Somnolent⁴ dans la journée²; Insomnie⁴
- ❧ Rêves⁴ effrayants³; beaucoup de projets⁴(23), réfléchit au sujet de leur exécution³(2);
- ❧ Aversion pour la compagnie³, taciturne³,



Organes des sens



☞ **Yeux**: photophobie⁴, id. post-coïtale³(9); douleur brûlante changeant de côté⁴(3); yeux enfoncés⁴; rouges³, jaunes⁴;

☞ **Nez**: épistaxis⁴; éternue⁴ avant la fièvre³(5);

☞ **Oreilles**: écoulement sanglant³(30) après longue supuration³(1); Douleur⁴, < en marchant³(18), en plein air³(10)

☞ Entend des bruits⁴ avant crise d'épilepsie³(6), après les règles³(3)

Estomac



- ⌘ Après poisson avarié³(4), viande avariée³(41)
- ⌘ Appétit diminué à l'heure de manger³(4); capricieux⁴,
- ⌘ Pas d'appétit⁴, revient après manger⁴(8), une bouchée⁴(6), par temps de brouillard⁴(1)
- ⌘ Faim de loup⁴ avant la fièvre¹(4), de nuit⁴(19); avant ou pendant la malaria³(3); sans soif⁴, empêche de dormir³(9)
- ⌘ Soif⁴, avant le fièvre³(10), après³(8); avant de transpirer⁴(4)
- ⌘ Vomit⁴, de la bile⁴, lors de coliques³(7)
- ⌘ Froid < buvant froid⁴(7)
- ⌘ Eructe⁴; Météorisé⁴, pas > par rot⁴(5), rot après viande³(6), fraîche³(1), amère⁴, constamment³(24), rance³(42), aigre⁴, après des fruits⁴(1), avec régurgitation d'aliments⁴,
- ⌘ Fermentation⁴(9), après des fruits⁴(1)
- ⌘ Indigestion⁴ par perte de fluides⁴(6), en allaitant³(2)
- ⌘ Douleur⁴, par perte de fluides⁴(2), > en bougeant⁴(8), D. crampoïde⁴, pressive⁴, le matin³(33), après avoir mangé⁴ un peu⁴(8)

Autres organes digestifs

Abdomen

- ∞ Froid⁴ < en buvant³(3), F. à chaque inspiration³(1)
- ∞ Congestion de la rate³(5)
- ∞ Flatulence⁴ après bière fraîche³(2), après fruits⁴(2); Fermentation⁴, après fruits⁴(1)

Rectum

- ∞ Diarrhée⁴ tous les 2 jours⁴(20), D. par faiblesse intestinale³(7), après maladie aigüe³(4), après perte de fluides³(3), après allaitement³(6)

Selles

- ∞ S. vertes³ & dures³(5);
- ∞ Lientérie⁴, le matin³(2), la nuit⁴(8), après des fruits⁴(2)

Organes urinaires



☞ Vessie:

- ☞ impossible d'uriner pendant la selle³(1);
- ☞ Énurésie⁴, É. au lit³, id chez enfant chétif³(1);
- ☞ Calculs³

☞ Urètre:

- ☞ Hémorragie de sang pur coagulé³(11)

☞ Urine:

- ☞ sédiment⁴ non collant³(4) , rouge³ brique³(24), rose³(14), farineux³(25), sombre¹(3)

Organes génitaux

Mâle:

- ∞ Gangrène³(15), du scrotum³(3) –
- ∞ tendance excessive à l'onanisme³;
- ∞ désir diminué³, dans troubles spinaux³ (1)

Femelle:

- ∞ Atonie utérine³, lors de métrorragie³ (5); avortement⁴;
- ∞ Congestion utérine³(47),
- ∞ Éclampsie³, après perte de sang³ (1);

Femelle:

- ∞ Inflammation⁴; Ovarite³ après excès sexuels³ (4), après hémorragie³ (2).
- ∞ Leucorrhée⁴, corrosive³, noire³ (9); sanglante⁴, après les règles³ (10); Lochies⁴, sombres³(11); fétides³(32), prolongées³(26); purulentes³(3), supprimées³, avec caillots³; profuses⁴;
- ∞ Règles profuses & prolongées³, noires⁴, aménorrhée³, trop fréquentes³; fluides³;
- ∞ Métrorragie⁴ avec épuisement⁴(29) suite à perte de sang³(6); après avortement³(26); pendant et après accouchement³; avec épuisement⁴(29); par perte de fluides³ (2); après tisane de camomille³ (2); de sang noir⁴; passive³; profuse³;

Modalités



☞ **Aggravation** : au lit⁴, bruit, secousses, moindre toucher, perte de fluides; vent froid, plein air⁴; effort mental; angoisse³; après manger⁴; émotion⁴;

☞ **Étiologie** : mauvais effets de la déshydratation; d'une perte de fluides vitaux; de masturbation; d'allaitement prolongé; intoxication alimentaire

☞ **Améliorations** : pression forte, se plier en deux, plein air¹, chaleur; en mangeant⁴; à l'obscurité⁴;

☞ **Périodicité** : tous les 2 jours; tous les 15 jours; tous les 3 mois; à la lune montante; en automne³; en été;

Généralités



- ⌘ Hypersensibilité des nerfs (occasionnée par la perte de liquides).
- ⌘ Engourdissement des régions sur lesquelles on repose.
- ⌘ Congestions.
- ⌘ Les veines sont très augmentées de volume.
- ⌘ Émaciation.

Deux aspects majeurs inséparables



Psychisme: L'écorc(h)é vif

Physique: Celui qui a perdu sa sève

China (l'écorc[h]é vif) (1)

- ∞ Faiblesse irritable; découragé, apathique
- ∞ Beaucoup d'idées⁴, de projets surtout le soir⁴(26) et de nuit⁴(30);
- ∞ Hypersensible⁴; pdt frisson² (17); pdt céphalée²(11); au bruit⁴; au moindre bruit¹(38); à la lumière⁴ (48); aux odeurs⁴; à la douleur⁴; aux impressions sensorielles³(45); au toucher¹;
- ∞ Irritabilité⁴ , Aversion pour les caresses¹(10);
- ∞ Anxieux⁴; coléreux⁴; peur⁴ des animaux⁴, de nuit⁴ (1); hypochondrie⁴; tend à vexer les autres⁴ (2); délire⁴; delirium tremens⁴; inconscient⁴;
- ∞ Soigneux⁴(70); avare⁴(70);
- ∞ Tendance aux œdèmes³;



China (l'écorc[h]é vif) (2)

- ∞ **Psychisme:** excitation émotionnelle <⁴; ne supporte pas d'être dévisagé³(45); effort intellectuel <³; anxiété⁴, soucieux³, pour des riens³(8); colère⁴; hors de lui-même³(65); gaité ⇌ tristesse³; manque de confiance en soi³; refuse de répondre³; aversion pour la compagnie qui l'<³; esprit confus³; revancharde³; naïf³; têtu³; pousse des cris en dormant³(93); des cris soudains³(27)
- ∞ **Yeux:** Mydriase⁴; Yeux jaunes⁴; cataracte menaçante⁴(18); cataracte noire⁴(31);
- ∞ Langue blanche⁴, le matin⁴(20);
- ∞ **Estomac:** anorexie⁴ par temps brumeux⁴(1); Hoquet³, lors de coliques par calculs biliaires³(1); désire acides, fruits qui l'<<
- ∞ **Abdomen;** Distendu⁴; météorisé⁴; < en buvant⁴(14), < après manger⁴; Fermentation⁴, due aux fruits⁴(1); Douleur pressive⁴, de l'hypochondre³, périodique³(29); > plié en avant³(1);
- ∞ Induration vaginale douloureuse¹(1);
- ∞ ♥ : Palpitation avant les frissons⁴(1); pendant les frissons⁴(23);
- ∞ **Respiration;** empêchée⁴, par la plénitude de l'abdomen³(9), de l'estomac⁴(6); soufflante³(6), à l'expiration³(2); stertoreuse³, stertoreuse en dormant³(7), stertoreuse & haletante à l'expiration³(13);

China (perte de sève) (1)

- Excitation après hémorragie⁴(1); épuisé physique avec tremblements
- Sueurs**: profuses⁴: le matin¹; la nuit⁴; en s'éveillant¹(12); en marchant³(15); sanglante¹(50); huileuse⁴(33); débilitantes³(15); unilatérale³(48); coté gauche³(14); S. au moindre effort³; S. tachant en jaune³(37)...
- Sang**: Hémorragie⁴; H. passive du nouveau-né pdt le part¹(1); épistaxis abondante, en jet⁴(27); Leucémie⁴(46); Anémie⁴; A. par perte de sang à la ménopause³(1); après hémorragie⁴(19); après maladie épuisante³(12); chlorose par carence en Fer³;
- Femelle**; Leucorrhée⁴; L. épuisante⁴(15); excoriante³; L. noire³(9); sanglante⁴; fétide³; L. purulente⁴(66); Uterus: congestion après hémorragie³; métrite post-hémorragique³(9); métrite suite d'excès sexuels³(1); Leucorrhée sanglante⁴ au lieu des règles¹(1); leucorrhée grumeleuse³(18), après les règles³(1);
- Lochies**⁴; sombres³(11); fétides³(32); prolongées³(27); purulentes³(3); supprimées³(47)
- Diarrhée**⁴, périodique⁴(20); l'été³(13); par atonie intestinale³(11); aqueuse⁴; indolore⁴, jaune³, avec gaz³, après des fruits⁴(41); au moindre écart de régime³(32);



China (a perdu sa sève) (2)



- ☞ Sang noir³(35); S. sombre³(53); S. rouge vif¹;
- ☞ Oreilles: écoulement de sang³(30), après suppuration prolongée³(1);
- ☞ **Male**: spermatorrhée sans érection³(71); pendant la selle³(36); lors de l'effort de défécation³(14)
- ☞ **Femelle**: éclampsie³; après perte de sang³(1); Cancer d'utérus⁴; atonie utérine³(40); Id. puerpérale₁(14); Id. avec hémorragie¹(6); diarrhée après avoir donné le sein³(6);
- ☞ **Vessie**: énurésie⁴ nocturne au lit³ chez enfant faible³(1);
- ☞ **Modalités**: *Aggravations*: le matin⁴; le soir⁴; la nuit⁴; au lit⁴; émotions⁴; en fermant les yeux⁴; pertes de fluides vitaux⁴(122); après manger⁴; après des fruits⁴; fruits acides⁴(14); après boire⁴; après du lait⁴; après lait aigre³(15); avant les règles⁴; pendant⁴; après³; au moindre courant d'air⁴; tout effort physique⁴ ou mental - *Améliorations*: par le jeûne³(72); par la pression⁴; par la chaleur - *Périodicité*: tous 2 jours⁴(33), tous les 7 jours³(29), tous les 14 jours³(22)